

# VILOFOSS®

## Dialyt®

### For all species

8 kg

Best before: See label on package (yy.mm.dd).  
Produced 720 days before the expiry date. Batch no.: See label on package.  
Produced by Vilofoss A/S, Ulsnaes 34, Denmark, 6300 Graasten,  
Tlf. +45 3368 5600, Reg. α-208-G751872, [www.vilofoss.com](http://www.vilofoss.com)



CARE | FOSS



# DK Dialyt

Diætetisk foder til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen til støtte af den fysiologiske fordøjelse hos dyr. Anbefales hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelsesforstyrrelser (diarré). Det anbefales at indhente råd fra en dyrlæge inden brug eller i forlængelse af brugsperioden.

## Analytiske bestanddele:

- 32,2 % Råaske
- 0,0 % Calcium
- 7,9 % Natrium

## Sammensætning:

- 62,5 % Sukker
- 32,5 % Mineralstoffer

## Tilsætningsstoffer (tilsat mængde pr. kg):

Sensoriske: 49250,00 mg Glycin (2b17034);

TILSKUDSFODER TIL HUSDYR  
Fremstillet 720 dage før udløbsdato.  
GMP+ FSA sikret.

## Dialyt til kalve

### Anvendelse:

1 portion består af 60 g Dialyt udrørt i 2 ltr. vand (40-50°). Mælk og Dialyt skal gives hver for sig. Der skal minimum være ½ time mellem tildeling af mælk og Dialyt.

### Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser, f.eks. ved flytning af kalve og/eller foderskift:

Ved hver fodring suppleres med ½ portion Dialyt.

### I perioder med fordøjelsesforstyrrelser (diarré):

Brugsperiode 1-7 dage.  
Ved hver fodring suppleres med 1 portion Dialyt.

## Dialyt til smågrise

### Anvendelse:

30 g Dialyt per liter vand (40-50°).

### Ved risiko for for fordøjelsesforstyrrelser:

Der gives Dialyt blanding efter drikkelyst. Tildeling af Dialyt kan med fordel ske 1-3 dage inden tildeling af somælks-ferstatningen påbegyndes.

## Dialyt til lam

### Brugsanvisning:

1 portion består af 6 g Dialyt udrørt i 0,2 ltr. vand (30-35°).

### Ved risiko for fordøjelsesforstyrrelser:

Lad dem fortsætte med at die og giv 1 portion Dialyt/døgn i 2-3 døgn  
Denne blanding må kun anvendes med indtil 200 g pr. kg af det daglige foder/føret.

# GB Dialyt

Dietetic feed for stabilisation of fluid and electrolyte balance to support the physiological digestion in animals. Recommended if there is a risk of digestive disorders and in periods with digestive issues (diarrhoea). It is recommended to seek the advice of a vet before use or before extending the administration period.

## Analytical constituents:

- 32,2 % Ashes
- 0,0 % Calcium
- 7,9 % Sodium

## Composition:

- 62,5 % Sugar
- 32,5 % Minerals

## Additives (guarantee per kg):

Sensory: 49250,00 mg Glycine (2b17034);

CONCENTRATE FOR LIVESTOCK.  
Produced 720 days before expiry date.  
GMP+ FSA assured.

## Dialyt for calves

### Use:

1 serving consists of 60 g Dialyt stirred in 2 litres of water (40-50°). Milk and Dialyt must be given separately. Allow for at least 30 minutes between administration of milk and Dialyt.

### If there is a risk of digestive issues, for instance when moving calves and/or changing feed

Supplement with ½ serving of Dialyt at each feed.

### In periods with digestive issues (diarrhoea)

Administration period 1-7 days.  
Supplement with 1 serving of Dialyt at each feed.

## Dialyt for piglets

### Use:

30 g Dialyt per litre of water (40-50°).

### If there is a risk of digestive issues (diarrhoea):

Give Dialyt mix according to drinking need.  
Dialyt can beneficially be administered 1-3 days before starting administration of sow milk replacer.

## Dialyt for lambs

### Use:

1 serving consists of 6 g Dialyt stirred in 0.2 litres of water (30-35°).

### If there is a risk of digestive issues (diarrhoea)

Let them continue to suckle and give 1 serving of Dialyt/day for 2-3 days.  
This mixture must only be used in a maximum ratio of 200 g per kg of the daily feed portion.

## DE Diallyt

Diätetisches Futter zur Stabilisierung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts zur Unterstützung der physiologischen Verdauung bei Tieren. Wird empfohlen, wenn ein Risiko von Verdauungsstörungen besteht oder wenn Verdauungsstörungen (Durchfall) auftreten. Vor der Verwendung oder der Verlängerung des Verwendungszeitraums wird empfohlen, den Rat eines Tierarztes einzuholen.

### Analytische Bestandteile:

32,2 % Rohasche  
0,0 % Calcium  
7,9 % Natrium

### Zusammensetzung:

62,5 % Zucker  
32,5 % Mineralstoffe  
Zusatzstoffe (zugeseetzte Menge pro kg):  
Sensorische: 49250,00 mg Glycin (2b17034);

ERGÄNZUNGSFUTTER FÜR NUTZTIERE  
720 Tage vor dem Ablaufdatum hergestellt.  
GMP+ FSA gesichert.

### Diallyt für Kälber

#### Einsatz:

1 Portion besteht aus 60 g Diallyt angerührt in 2 l Wasser (40-50 °C). Milch und Diallyt sind separat zu geben. Zwischen der Verabreichung von Milch und Diallyt muss mindestens eine ½ Stunde liegen.

**Bei einem Risiko von Verdauungsstörungen, z. B. beim Verlegen von Kälbern und/oder einem Futterwechsel:**

Bei jeder Fütterung zusätzlich eine ½ Portion Diallyt geben.

**In Zeiten mit Verdauungsstörungen (Durchfall):**

Verabreichungszeitraum 1-7 Tage.  
Bei jeder Fütterung zusätzlich eine 1 Portion Diallyt geben.

### Diallyt für Ferkel

#### Einsatz:

30 g Diallyt pro Liter Wasser (40-50 °C).

**Bei einem Risiko von Verdauungsstörungen (Durchfall):**

Diallyt-Mischung nach Trinklust geben. Die Verabreichung von Diallyt erfolgt idealerweise über 1-3 Tage, bis mit der Verabreichung der Sauenersatzmilch begonnen wird.

### Diallyt für Lämmer

#### Verwendung:

1 Portion besteht aus 6 g Diallyt angerührt in 0,2 l Wasser (30-35 °C).

**Bei einem Risiko von Verdauungsstörungen (Durchfall):**

Weiterhin saugen lassen und 1 Portion Diallyt/Tag über 2-3 Tage verabreichen. Diese Mischung darf maximal im Verhältnis 200 g pro kg des täglichen Futters verwendet werden.

## FR Diallyt

Aliment diététique de stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau pour faciliter la digestion physiologique des animaux. Recommandé en cas de risque de troubles digestifs (diarrhée) pendant et après ceux-ci. Avant utilisation et avant prolongation de la durée d'utilisation, il est recommandé de consulter un vétérinaire.

### Constituants analytiques :

32,2 % Cendres brutes  
0,0 % Calcium  
7,9 % Sodium

### Composition :

62,5 % Sucre  
32,5 % Minéraux  
Additifs (quantité ajoutée par kg) :  
Sensoriels : 49250,00 mg Glycine (2b17034)

ALIMENTS MINÉRAUX POUR LE BÉTAIL  
Fabriqué 720 jours avant la date limite de conservation. Garantis GMP+ FSA.

### Diallyt pour veaux

#### Application :

1 portion se compose de 60 g de Diallyt mélangés dans 2 litres d'eau (à 40-50°). Le lait et Diallyt doivent être donnés séparément. Il doit y avoir au moins une demi-heure entre la distribution de lait et celle de Diallyt.

**En cas de risque de troubles digestifs, par ex. lors du transfert des veaux et/ou d'un changement d'alimentation**  
Chaque repas est complété par une demi-portion de Diallyt.

**En cas de troubles digestifs (diarrhée)**

Durée d'utilisation : 1 à 7 jours.  
Chaque repas est complété par 1 portion de Diallyt.

### Diallyt pour porcelets

#### Application :

30 g de Diallyt par litre d'eau (à 40-50°).

**En cas de risque de troubles digestifs (diarrhée)**

Donner le mélange Diallyt à boire selon la soif.

Il est conseillé d'administrer Diallyt 1 à 3 jours avant de débiter la distribution de lait de remplacement pour porcelet.

### Diallyt pour agneaux

#### Application :

1 portion se compose de 6 g de Diallyt mélangés dans 0,2 litre d'eau (à 30-35°).

**En cas de risque de troubles digestifs (diarrhée)**

Laisser les agneaux téter et administrer 1 portion de Diallyt par jour pendant 2-3 jours.  
Ce mélange ne doit pas dépasser la dose de 200 g par kg dans l'alimentation journalière du bétail.

# SE Dialyt

Dietfoder som stabiliserar vätske- och elektrolytbalansen som stöd för den fysiologiska matsmältningen hos djur. Rekommenderas om det föreligger risk för matsmältningsstörningar och under perioder med matsmältningsstörningar (diarré). Det rekommenderas att kontakta en veterinär för rådgivning före eller vid förlängd användning.

## Analytiska beståndsdelar:

- 32,2 % råaska
- 0,0 % kalcium
- 7,9 % natrium

## Sammansättning:

- 62,5 % socker
- 32,5 % mineralämnen

## Tillsatser (tillsatt mängd per kg):

Sensoriska: 49 250,00 mg glycin (2b17034)

TILLSKOTTSFODER TILL HUSDJUR  
Tillverkat 720 dagar före utgångsdatum.  
GMP+ FSA-säkrat.

## Dialyt till kalvar

### Användning:

1 portion består av 60 g Dialyt utblandat i 2 l vatten (40–50°). Mjölk och Dialyt ska ges var för sig. Det ska gå minst en halvtimme mellan tilldelning av mjölk och Dialyt.

### Vid risk för matsmältningsstörningar, t.ex. vid flytt av kalvar och/eller foderbyte

Vid varje utfodring kompletteras med ½ portion Dialyt.

### Under perioder med matsmältningsstörningar (diarré).

Användningsperiod 1–7 dagar.  
Vid varje utfodring kompletteras med 1 portion Dialyt.

## Dialyt till smågrisar

### Användning:

30 g Dialyt per liter vatten (40–50 °).  
**Vid risk för matsmältningsstörningar (diarré)**  
Dialytblandning ges fritt vid vattenintag. Tilldelning av Dialyt kan med fördel ske 1–3 dagar innan tilldelning av mjölk- ersättning inleds.

## Dialyt till lamm

### Användning

1 portion består av 6 g Dialyt utblandat i 0,2 l vatten (30–35°).

### Vid risk för matsmältningsstörningar (diarré)

Låt lammen fortsätta att dia och ge 1 portion Dialyt/dygn under 2–3 dygn. Blandningen får endast användas med upp till 200 g per kg av den dagliga fodergivan.

# EE Dialyt

Dieeteetiline sööt vedeliku ja elektrolüüdi tasakaalu stabiliseerimiseks, et toetada loomade füsioloogilist seedimist. Soovitav seedehäirete ohu korral ja seedeprobleemide (kõhulahtisus) ajal. Enne kasutamise alustamist või manustamisaja pikendamist on soovitatav konsulteerida loomaarstiga.

## Analüütilised koostisosad:

- 32,2% tuhk;
- 0,0% kaltsium;
- 7,9% naatrium

## Koostis:

- 62,5% suhkur
- 32,5% mineraalid;

## Lisaained (garanteeritud kg kohta):

Sensoorne: 49250,00 mg glütsiini (2b17034);

KONTSENTRAAT KARILOOMADELE.  
Valmistatud 720 päeva enne aegumiskuupäeva. GMP + FSA kinnitusega.

## Dialüüt vasikatele

### Kasutamine

1 portsjon koosneb 60 g dialüüdist segatuna 2 liitris vees (40–50 °). Piim ja dialüüt tuleb manustada eraldi. Piima ja dialüüdi manustamise vahele peab jääma vähemalt 30 minutit.

### Seedeprobleemide ohu korral, näiteks vasikate liigutamisel ja/või sööda vahetamisel

Lisage ½ portsjonit dialüüti igal sööt-miskorral.

### Seedeprobleemide (kõhulahtisus) ajal

Manustamisperiood 1–7 päeva.  
Lisage 1 portsjon dialüüti igal söötmiskorral.

## Dialüüt põrsastele

### Kasutamine

30 g dialüüti ühe liitri vee kohta (40–50 °).  
**Seedeprobleemide (kõhulahtisus) ohu korral**  
Andke dialüüdisegu joomisvajaduse järgi. Eelistatavalt tuleks dialüüti manustada 1–3 päeva enne emise piima asendaja manustamise alustamist.

## Dialüüt talledele

### Kasutamine

1 portsjon koosneb 6 g dialüüdist segatuna 0,2 liitris vees (30–35 °).

### Seedeprobleemide (kõhulahtisus) ohu korral

Laske imetamisel jätkuda ja andke 1 portsjon dialüüti päevas 2–3 päeva jooksul. Segu kasutamise maksimaalne lubatud suhtarv on 200 g päevase söödaportsjoni

## RU Diallyt

Диетический корм для стабилизации баланса электролитов и жидкости для поддержания нормального пищеварения у животных. Рекомендуется при наличии рисков расстройств пищеварения или в периоды расстройств пищеварения (диареи). Перед использованием или продлением периода использования рекомендуется обратиться к ветеринару.

### Питательные вещества:

32,2 % зола;  
0,0 % кальция;  
7,9 % натрия

### Состав:

62,5 % сахара  
32,5 % минералов;  
Добавки (гарантированное содержание в кг):

### Вкусовые добавки:

49250,00 мг глицина (2b17034);

Кормовая добавка для продуктивных животных  
Изготовлен за 720 дней до даты истечения срока годности. Гарантия GMP + FSA.

### Диалит для телят

#### Применение:

1 порция состоит из 60 г Диалита, растворенного в 2 литрах воды (40-50 °C). Не смешивайте Диалит с молоком. Между кормлением молоком и Диалитом должно пройти не менее полчаса.

Если существует риск расстройств пищеварения, например, при перевозке телят и/или изменении корма  
Добавляйте половину порции Диалита при каждом кормлении.

### Во время периодов расстройств пищеварения (диареи)

Период применения 1-7 дней.  
Добавляйте одну порцию Диалита при каждом кормлении.

### Диалит для поросят

#### Применение:

30 г Диалита на литр воды (40-50 °C).  
При риске расстройств пищеварения (диареи)

### Давать смесь Диалита вместо обычного питья.

Целесообразно давать Диалит в течение 1-3 дней, прежде чем начать переводить поросят на заменитель свиного молока.

### Диалит для ягнят

#### Применение

1 порция состоит из 6 г Диалита, растворенного в 0,2 литрах воды (30-35 °C).

### При риске расстройств пищеварения (диареи)

Давать 1 порцию Диалита в день в течение 2-3 дней, не отнимая от вымени.

Максимальное соотношение данной смеси – 200 г на кг суточной порции корма.

## PL Diallyt

Dietetyczna pasza do stabilizacji równowagi płynów i elektrolitów, wspomagająca fizjologiczne trawienie u zwierząt. Zalecana w przypadku ryzyka wystąpienia zaburzeń trawiennych oraz w okresach z problemami trawiennymi (biegunka). Zaleca się zasięgnąć porady lekarza weterynarii przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu podawania.

### Składniki analityczne:

32,2% popiół;  
0,0% wapń;  
7,9% sód

### Skład:

62,5% cukier  
32,5% minerały;

### Dodatki (gwarancja na kg):

Narządy zmysłów: 49250,00 mg Glicyna (2b17034);

KONCENTRAT PASZOWY DLA ZWIERZĄT HODOWLANÝCH  
Wyprodukowano 720 dni przed upływem terminu ważności. Z gwarancją GMP+ FSA.

### Diallyt dla cieląt

#### Sposób użycia:

1 porcja składa się z 60 g preparatu Diallyt rozmieszanych w 2 litrach wody (40-50°).  
Mleko i Diallyt należy podawać oddzielnie. Pomiędzy podaniem mleka a preparatu Diallyt należy odczekać co najmniej 30 minut.

### Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia problemów trawiennych, np. przy przenoszeniu cieląt i/lub zmianie paszy

Uzupełnić o ½ porcji preparatu Diallyt przy każdym karmieniu.

### W okresach z problemami trawiennymi (biegunka)

Okres podawania 1-7 dni.  
Uzupełnić 1 porcją preparatu Diallyt przy każdym karmieniu.

### Diallyt dla prosiąt

#### Sposób użycia:

30 g preparatu Diallyt na litr wody (40-50°).

### Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia problemów trawiennych (biegunka)

Podawać mieszkankę preparatu Diallyt odpowiednio do zapotrzebowania na picie.

Diallyt można korzystnie podawać na 1-3 dni przed rozpoczęciem podawania preparatu mlekozastępczego dla loch.

### Diallyt dla jagniąt

#### Sposób użycia

1 porcja składa się z 6 g preparatu Diallyt rozmieszanych w 0,2 litrach wody (30-35°).

### Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia problemów trawiennych (biegunka)

Pozwolić im nadal ssać i podawać 1 porcję preparatu Diallyt na dobę przez 2-3 dni.

Tę mieszkankę można stosować wyłącznie w maksymalnym stosunku 200 g na kilogramiennej porcji paszy.

Masa netto (kg):

Nr partii:

Nr produktu:

Najlepiej spożyć przed: (rr.mm.dd)

### Producer:

### Vilofoss

Ulsnæs 34, DK-6300 Gråsten

Telefon: +45 3368 5600

Fax: +45 3368 8700

info@vilofoss.com

www.vilofoss.com

Reg. no. α-208-G751872

# BG Dialyt

Диетичен фураж за стабилизиране на водно-електролитния баланс за подпомагане на физиологичното храносмилане при животните. Препоръчва се, ако съществува риск от храносмилателни разстройства и в периоди с храносмилателни проблеми (диария). Препоръчително е да потърсите съвет от ветеринар преди употреба или преди удължаване на периода на приложение.

## Аналитични съставни части:

- 32,2%    пепел;
- 0,0%    калций;
- 7,9%    натрий

## Състав:

- 62,5 %    Захар
- 32,5 %    Минерали ;

## Добавки (гаранция за кг):

Сетивност: 49250,00 мг глицин (2b17034);

КОНЦЕНТРАТ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ  
Произведено 720 дни преди срока на годност. GMP+ FSA гарантирани.

## Dialyt за телета

### Употреба:

1 порция се състои от 60 г Dialyt, разбъркан в 2 литра вода (40-50 °). Млякото и Dialyt трябва да се дават отделно. Оставете поне 30 минути между приема на мляко и Dialyt.

**Ако съществува риск от храносмилателни проблеми, например при преместване на телета и/или смяна на фураж**  
Допълнете с ½ порция Dialyt при всяко хранене.

В периоди с храносмилателни проблеми (диария)  
Период на приложение 1-7 дни.

Добавка с 1 порция Dialyt за всяко хранене.

## Dialyt за бозаещи прасенца

### Употреба:

30 г Dialyt на литър вода (40-50°).

### В случай на риск от храносмилателни проблеми (диария)

Давайте микс Dialyt според нуждата от поене.

Dialyt може да се прилага благоприятно 1-3 дни преди започване на приложението на заместителя на млякото на бозаещите прасета.

## Dialyt за агнета

### Употреба

1 порция се състои от 6 г Dialyt, разбъркан в 0,2 литра вода (30-35°).

### В случай на риск от храносмилателни проблеми (диария)

Нека продължат да бозаят, като им давате по 1 порция Dialyt/дневно в продължение на 2-3 дни.

Тази смес се използва задължително в максимално съотношение от 200 г на кг от дневната дажба фураж.

# RO Dialyt

Furaje dietetice pentru stabilizarea echilibrului dintre fluide și electroliți în scopul susținerii digestiei fiziologice la animale. Se recomandă dacă există riscul de tulburări digestive și în perioadele în care au apar probleme digestive (diaree). Vă recomandăm să solicitați sfatul unui veterinar înainte de utilizare sau după prelungirea perioadei de administrare.

## Constituenți analitici:

- 32,2 %    cenușă;
- 0,0 %    calciu;
- 7,9 %    sodiu

## Compoziție:

- 62,5 %    zahăr
- 32,5 %    minerale ;

## Aditivi (garanție per kg):

Sensory: 49250,00 mg glicină (2b17034);

## CONCENTRAT PENTRU VITĂ

Fabricat cu 720 de zile înaintea datei de expirare. GMP+ FSA asigurat.

## Dialyt pentru viței

### Utilizare:

1 porție conține 60 g Dialyt în 2 litri de apă (40-50°). Laptele și Dialyt trebuie administrate separat. Așteptați cel puțin 30 de minute între administrarea laptelui și Dialyt.

### Dacă există risc de tulburări digestive, de ex. la mutarea vițelor și/sau schimbarea furajului

Suplimentați cu o rație de ½ porție de Dialyt la fiecare hrănire.

### În perioade cu tulburări digestive (diaree)

Durată de administrare 1-7 zile.  
Suplimentați cu o porție de Dialyt la fiecare hrănire.

## Dialyt pentru purcei

### Utilizare:

30 g Dialyt per litru de apă (40-50°).

### Dacă există riscul de tulburări digestive (diaree)

Administrați amestecul Dialyt în funcție de nevoia lor de a bea.

Dialyt are efecte benefice dacă este administrat 1-3 zile înainte de a începe administrarea de înlocuitor al laptelui de scroafă.

## Dialyt pentru miei

### Utilizare

1 porție conține 6 g Dialyt în 0,2 litri de apă (30-35°).

### Dacă există riscul de tulburări digestive (diaree)

Lăsați mieii să se alăpteze în continuare și administrați-le 1 porție de Dialyt/zi timp de 2-3 zile.

Acest amestec trebuie utilizat într-un raport maxim de 200 g/kg din porția zilnică de furaje.

# HU Dialyt

Dietetikus táplálás a folyadék- és elektrolit-egyensúly stabilizálásához, ami támogatja az állomány fiziológiás emésztését. A termék használata akkor ajánlott, ha fennáll az emésztési rendellenesség (hasmenés) vagy annak kockázata. Használat előtt vagy az adagolási időszak meghosszabbítása előtt ajánlott állatorvos tanácsát kérni.

## Analitikai összetétel:

32,2 % hamu;  
0,0 % kalcium;  
7,9 % nátrium.

## Összetétel:

62,5 % cukor  
32,5 % ásványi anyagok

## Adalékanyagok (kilogrammonként garantált):

Erzékszervi: 49250,00 mg glicin (2b17034);

## KONCENTRÁTUM ÁLLATÁLLOMÁNY SZÁMÁRA

A lejárat dátum előtt 720 nappal gyártották. GMP + FSA által biztosított.

## Dialyt fiatal szarvasmarhák számára

### Használat:

1 adag 60 g Dialyt 2 liter vízben (40-50 °C) elkeverve. A tejet és a Diallytot külön kell adni. A tej és a Dialyt beadása között legalább 30 percet kell várni.

## Ha fennáll az emésztési problémák veszélye, például borjak mozgatasakor és/vagy takarmányváltáskor.

Minden etetés alkalmával kor adjon ½ adag Dialytot.

## Emésztési problémákkal (hasmenés) járó időszakokban

Adagolási időszak 1-7 nap. Minden etetéskor 1 adag Dialytot adjon hozzá.

## Dialyt fiatal sertések számára

### Használat:

30 g Dialyt egy liter vízhez (40-50 °C).

## Ha fennáll az emésztési zavar (hasmenés) kockázata

Adjon Dialyt keveréket az ivási szükségletnek megfelelően.

A Dialyt előnyösen adható 1-3 nappal a kocatejpotló adagolásának megkezdése előtt.

## Dialyt fiatal birkák számára

### Használat:

1 adag 6 g Dialyt 0,2 liter vízben (30-35 °C) elkeverve.

## Ha fennáll az emésztési zavar (hasmenés) kockázata

Hagyja a fiatal birkákat tovább szopni, és adjon napi 1 adag Diallytot 2-3 napig.

Ezt az összetevőt maximum 200 g/ kg arányban használhatja napi hozzátáplálásként.

# LV Dialyt

Diētiskā pārtika, kas atbalsta dzīvnieku gremošanas fizioloģiskos procesus, stabilizējot šķidrumu un elektrolītu līdzsvaru. Ieteicams, ja pastāv gremošanas traucējumu risks, un gremošanas traucējumu (caurejas) laikā. Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.

## Analītiskās sastāvdaļas:

32,2% pelni;  
0,0% kalcijs;  
7,9% nātrijs

## Sastāvs:

62,5% cukurs  
32,5% minerālvielas;

## Piedevas (garantētās, uz kg):

Sensorās: 49250,00 mg glicīns (2b17034);

## KONCENTRĀTS MĀJLOPIEM.

Izgatavots 720 dienas pirms derīguma termiņa beigām. GMP+ FSA garantēts.

## Dialyt tejiem

### Lietošana:

1 devu iegūst, 60 g Dialyt iemaisot 2 litros ūdens (40–50 °C). Piens un Dialyt jādod atsevišķi. Pēc piena iebarošanas jānogaida vismaz 30 minūtes līdz Dialyt lietošanai.

## Ja pastāv gremošanas traucējumu risks, piemēram, pārvietojot teļus un/vai mainot lopbarību

Papildiniet katru lopbarības ēdienreizi ar ½ devu Dialyt.

## Gremošanas traucējumu (caurejas) laikā

Lietošanas ilgums 1–7 dienas.

Papildiniet ar 1 Dialyt devu katrā ēdienreizē.

## Dialyt sivēniem

### Lietošana:

30 g Dialyt uz litru ūdens (40–50°).

## Ja pastāv gremošanas traucējumu (caurejas) risks

Dodiet Dialyt maisījumu atkarībā no šķidruma uzņemšanas vajadzības.

Dialyt ir ieteicams lietot 1–3 dienas, pirms sākat dot cūkas piena aizstājēju.

## Dialyt jēriem

### Lietošana

1 devu iegūst, 6 g Dialyt iemaisot 0,2 litros ūdens (30–35 °C).

## Ja pastāv gremošanas traucējumu (caurejas) risks

Ļaujiet turpināt zīdīšanu un 2-3 dienas dodiet tiem 1 porciju Dialyt dienā.

Šis maisījums jālieto, nepārsniedzot maksimālo proporciju – 200 g uz 1 kg dienas barības porcijas.

# LT Dialyt

Dietiniai pašarai skysčių ir elektrolitų pusiausvyrai stabilizuoti, siekiant palaikyti fiziologinį gyvūnų virškinimą. Rekomenduojama, kai yra virškinimo sutrikimų rizika ir virškinimo sutrikimų (viduriavimo) laikotarpiu. Prieš vartojimą arba prieš pratęsiant vartojimo laikotarpį rekomenduojama pasitarti su veterinarijos gydytoju.

## Analitinės sudedamosios dalys:

32,2 % pelenų;  
0,0 % kalcio;  
7,9 % natrio

## Sudėtis:

62,5 % cukraus  
32,5 % mineralinių medžiagų;

## Priedai (garantija kg):

juslinis: 49250,00 mg glicino (2b17034);

## KONCENTRATAS GALVIJAMS.

Pagaminta 720 dienų prieš galiojimo pabaigos datą. GMP+ FSA garantija.

## „Dialyt“ veršeliams

### Vartojimas:

1 porciją sudaro 60 g „Dialyt“, išmaišyto 2 litruose vandens (40-50 °C). Pieną ir „Dialyt“ reikia duoti atskirai. Padarykite mažiausiai 30 minučių pertrauką tarp pieno ir „Dialyt“ davimo.

### Jei kyla virškinimo problemų rizika, pvz., gabenant veršelius ir (arba) keičiant pašarus

Papildykite ½ „Dialyt“ porcijos kiekvieną maitinimą.

### Virškinimo sutrikimų (viduriavimo) laikotarpiu

Vartojimo laikotarpis: 1-7 dienos.

Papildykite 1 „Dialyt“ porciją kiekvieną maitinimą.

## „Dialyt“ paršeliams

### Vartojimas:

30 g „Dialyt“ litrui vandens (40-50 °C).

### Jei yra virškinimo sutrikimų (viduriavimo) rizika

Duokite „Dialyt“ mišinio atsižvelgdami į gėrimo poreikį.

„Dialyt“ gali būti naudinga skirti 1-3 dienas prieš pradėdant duoti kiaulės pieno pakaitalą.

## „Dialyt“ ėriukams

### Vartojimas

1 porciją sudaro 6 g „Dialyt“, išmaišyto 0,2 litro vandens (30-35 °C).

### Jei yra virškinimo sutrikimų (viduriavimo) rizika

Leiskite toliau žįsti ir duokite po 1 porciją „Dialyt“ per dieną 2-3 dienas.

Šio mišinio reikia vartoti ne daugiau nei 200 g paros pašarų porcijos kilogramui. Grynasis svoris (kg):