

Data Sheet

Bicando Gel

Identification and manufacturer		
Trade name:	Bicando Gel	Manufacturer: Biofiber-Damino A/S Staushedevej 10 DK-6621 Gesten Denmark
Physical aspect:	Viscous liquid	
Color:	Brownish	Reg. No. : 208-R 752720
Smell:	Sourish	Phone: +45 75 55 74 11
Bulk density:	approx. 1050 g/l	Fax: +45 75 55 75 68

Application
Liquid electrolytes for suckling piglets. Dietetic complementary feedingstuff.

Dosage
2 pump strokes (= approx. 4 g) per piglet and dose. 1-2 doses per day for 1-2 days.

Packing Sizes
250 g / plastic bottle, 6 bottles / box, 10 boxes / carton, 28 cartons / pallet.

Storage life
Before opening: Minimum 1 year after production. After opening: Up to 14 days.

Analytical Constituents
Crude protein 1.5 %, crude oils and fats 1 %, crude fibre 0.5 %, crude ash 1.5 %, moisture 85 %, lysine 0 %, methionine 0 %, sodium 0.4 %, potassium 0.3 %, chloride 0.6 %.

Composition
Dextrose*, egg powder*, fenugreek seed*, psyllium seed husk*, potato starch*, sodium chloride, potassium chloride, mono-sodium phosphate, magnesium oxide.
* Carbohydrate source.

Additives per kg
Technological : E 321 – BHT 20 mg, E 324 – Ethoxyquin 10 mg, E 320 – BHA 2 mg.

Undesirable substances, maximum content relative to a feed with a moisture content of 12 %
As 4 mg/kg, Cd 0.5 mg/kg, F 500 mg/kg, Pb 10 mg/kg, Hg 0.1 mg/kg, Dioxins 0.75 ng WHO-PCDD/ F-TEQ/kg, Sum of dioxins and dl-PCBs 1.5 ng WHO-PCDD/ F-PCB-TEQ/kg.

DK

BiCando Gel udfodres ved 20-25°C. Varm eventuelt flasken i vandbad. Omryst flasken. Monter det korte slangestykke på tuden og det længere stykke i bunden af pumpen. Monter pumpen på flasken. Rengør pumpen før eventuel montering på ny flaske.
Dosering: 1-2 doseringer pr. dag i 1-2 dage. 2 pumpeslag (= ca. 4 g) pr. gris pr. dosering.
Holdbarhed: Skal anvendes inden 14 dage efter åbning.
Øvrige oplysninger: Se emballageæske.

F

Administre **BiCando Gel** à 20-25°C. Réchauffer éventuellement le flacon dans un bain-marie. Agiter le flacon. Fixer le tube court au bout de la pompe, et le tube long au bas de la pompe. Monter la pompe sur le flacon. Nettoyer la pompe avant un éventuel montage sur un nouveau flacon.
Dosage : 1-2 doses par jour, pendant 1-2 jours. 2 pressions (= env. 4 g) par porcelet pour une dose.
Durabilité : À utiliser dans les 14 jours maximum après l'ouverture.
Pour plus d'informations : lire la notice sur l'emballage.



DK DIÆTETISK TILSKUDSFODER TIL SMÅGRIS
 FLYDENDE ELEKTROLYTER
GB DIETETIC COMPLEMENTARY FEEDINGSTUFF FOR PIGLETS
 LIQUID ELECTROLYTES
D DIÄT-ERGÄNZUNGSFUTTER FÜR Ferkel
 FLÜSSIGE ELEKTROLYTE
E ALIMENT COMPLÉMENTAIRE DIÉTÉTIQUE POUR PORCELETS
 ELECTROLYTES LIQUIDES

D

BiCando Gel bei 20-25°C verfüttern. Die Flasche eventuell im Wasserbad erwärmen. Die Flasche schütteln. Das kurze Stück Schlauch an der Pumpenspitze und das längere Stück an der Unterseite der Pumpe befestigen. Die Pumpe montieren. Vor einer eventuellen Montage auf eine neue Flasche die Pumpe reinigen.
Dosierung: 1-2 Dosen pro Tag während 1-2 Tage. 2 Pumpenstöße (= ca. 4 g) je Ferkel und Dosis.
Haltbarkeit: Spätestens zu verbrauchen bis 14 Tage nach der Öffnung.
Weitere Informationen: Siehe Packung.

GB

Administer **BiCando Gel** at 20-25°C. Warm up the bottle in a water bath, if required. Shake the bottle. Fix the short piece of tube to the pump tip and the longer one to the bottom of the pump. Attach the pump to the bottle. Clean the pump before attaching it to a new bottle.
Dosage: 1-2 doses per day for 1-2 days. 2 pump strokes (= approx. 4 g) per piglet and dose.
Storage life: Use before 14 days after opening.
For more details: See the packaging.

321-02

BiCando Gel BiCando Gel BiCando Gel BiCando Gel BiCando Gel

DK DIÆTETISK TILSKUDSFODER TIL SMÅGRIS

TIL STABILISERING AF VÆSKE- OG ELEKTROLYTBALANCEN HOS PATTEGRIS

Væsentlige ernæringssegenskaber ved **BiCando Gel**: Overvejende elektrolytter og letoptagelige kulhydrater.

BiCando Gel anvendes til pattegrise, når der er risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med diarré. **BiCando Gel** kan med fordel anvendes som supplement til medicinsk behandling. Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.

BiCando Gel udfodres ved 20-25°C. Opvarm evt. flasken i vandbad. Omryst flasken. Monter det korte slangestykke på pumpetuden og det længere stykke i bunden af pumpen. Monter pumpen på flasken. Rengør pumpen før evt. montering på ny flaske.

Dosering: 1-2 doseringer pr. dag i 1-2 dage. 2 pumpeslag (= ca. 4 ml) pr. gris pr. dosering.

Analytiske bestanddele:

Råprotein 1,5%, Råfedt 1%, Træstof 0,5%, Råaske 1,5%, Vand 85%, Lysin 0%, Methionin 0%, Natrium 0,4%, Kalium 0,3%, Klorider 0,6%.

Sammensætning:

Dextrose*, æggepulver*, bukkehornsfrø*, loppefrøskaller*, kartoffelstivelse*, natriumklorid, kaliumklorid, mononatriumfosfat, magnesiumoxid.
 * Kulhydratkilde.

Tilsætningsstoffer pr. kg:

Teknologiske: E 321 - BHT 20 mg, E 324 - Etoxyquin 10 mg, E 320 - BHA 2 mg.

Skal helst anvendes inden DD/MM/ÅÅ og batchnummer: Se batch-etiket.

Skal anvendes inden 14 dage efter åbning.

Fremstillet 12 mdr. før datoen på batch-etiketten.

Nettovægt: 6 x 250 g.

Producent: BIOFIBER-DAMINO A/S

Staushedevej 10, DK-6621 Gesten, Reg. Nr. 208-R752720, www.damino.com

BiCando Gel BiCando Gel BiCando Gel BiCando Gel BiCando Gel

322-03