



ORNESTATION MORS

Vi gi'r en
hånd med!

D I N T O T A L L E V E R A N D Ø R

MorsLyt

Tilskudsfoder til husdyr

Diætfoder til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen til støtte af den fysiologiske fordøjelse.

MorsLyt er et velsmagende hvidt pulver beregnet til udrøring i vand, hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelighedsforstyrrelser (diarré). Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. MorsLyt indeholder elektrolytterne natrium, chlor, kalium og bicarbonat, blandet med druesukker. Tilskud af elektrolytter genopretter væskebalancen hos dyr med mave-/tarmforstyrrelser - og forebygger problemer med mave og tarm. Druesukker er letoptagelig energi.

Der medfølger målebæger 80 g. Fremstillet 18 måneder før udløbsdato.

Produktanvendelse

- Portion består af 80 g MorsLyt rørt ud i 2,5 liter vand (anbefalet 40-50°C). Varmt vand letter udrøringen.
- Forebyg problemer ved at give MorsLyt de første par dage efter at dyrene er flyttet. Forebygger problemer med mave-/tarmforstyrrelser.
- Giv MorsLyt som behandlingstilskud. Kan hjælpe dyr med mave-/tarmforstyrrelser på ret køl igen.

Brugsanvisning

1 portion består af 80 g MorsLyt udrørt i 2,5 ltr. vand (anbefalet 40-50°C). Mælk og MorsLyt skal gives hver for sig. Der skal minimum være ½ time mellem tildeling af mælk og MorsLyt. Samtidig fodring med mælk bør undgås ved dyr med løbemave.

MorsLyt til kalve:

1. Flytning af kalve:
 1. døgn: Ved hver fodring gives ½ mælkeration, suppleret med 1 portion MorsLyt. Derefter gives fuld mælkeration og ingen MorsLyt.
2. Forebyggende tilskud med MorsLyt:
 1. døgn: Ved hver fodring gives ½ mælkeration, suppleret med 1 portion MorsLyt.
 2. døgn: Ved hver fodring gives ¾ mælkeration, suppleret med 1 portion MorsLyt.
 3. døgn: Der gives igen fuld mælkeration og ingen MorsLyt.
3. Ved diarré:
 1. døgn: Mælken erstattes (ved råmælk dog kun halvdelen) af MorsLyt efter drukkelyst (4 portioner fordelt over 2-4 fodringer).
 2. døgn: Ved hver fodring gives ½ mælkeration, suppleret med 1 portion MorsLyt.
 3. døgn: Ved hver fodring gives ¾ mælkeration, suppleret med 1 portion MorsLyt.
 4. døgn: Der gives igen fuld mælkeration og ingen MorsLyt.

MorsLyt til smågrise:

1. Flytning af smågrise:
 1. døgn gives MorsLyt efter drukkelyst.
 2. døgn gives 2 portioner MorsLyt pr. kuld.
 3. døgn gives ingen MorsLyt.
2. Forebyggende tilskud med MorsLyt:

Der gives 1-2 portioner MorsLyt pr. kuld pr. dag.
3. Ved diarré:

Smågrisene skal have MorsLyt efter drukkelyst.

Indholdsgaranti:

33,8 %	Råaske
12,64 %	Chlorider
9,3 %	Natrium
3,13 %	Kalium
0,2 %	Råprotein
0,0 %	Råfedt
0,0 %	Træstof
0,0 %	Calcium
0,0 %	Fosfor
0,0 %	Magnesium

Sammensætning:

Dextrose*
Fodersalt
Natriumbicarbonat
Kaliumklorid
Tørgær

Udløbsdato:

Batch nr.:

Netto: 12 kg

*Kulhydrat-kilde

Ornestation Mors • Gl. Møllevej 97 • 7970 Redsted • Tel 9776 2133

E-mail: info@ornestationmors.dk • Web: ornestationmors.dk

Afdeling Vestsjælland: Telefon 5886 9308

Produceret af Vitfoss A/S for Ornestation Mors

