

FASTHYDRAL

En væskeerstatning med gavnlige bakterier for tarmfloraen, til hurtig genopretning af tarmen efter diarré hos kalve og smågrise.

Fasthydral genopretter hurtigt væske- og saltbalancen i kroppen hos kalve og smågrise, der er ramt af dehydrering og/eller diarré. Fasthydral tilføjer også gavnlige bakterier til tarmfloraen, som accelererer restitutionen efter diarré. De vigtigste virkninger af Fasthydral er:

- Genoprettelse af væske- og saltbalance. Det betyder omhyggeligt afbalancerede forhold mellem natrium, kalium og klor.
- Give energi og næring til kalven eller grisen.
- Modvirke forsurening af blodet gennem bufferstoffer.
- Genskabe tarmfloraen gennem tilsætning af gavnlige bakterier.

Brug:

Ved første tegn på diarré skal behandling med Fasthydral påbegyndes.

1 liter opløsning til brug, fremstilles ved at opløse 1 tablet i 1 liter lunkent vand, cirka 37°C.

Brug arbejdsopløsningen umiddelbart efter blanding. Tilberedt opløsning skal udskiftes efter 24 timer.

Ved svære symptomer eller længerevarende forløb kontaktes dyrlæge. Fasthydral bør gives i højst 7 dage.

Kalve: Dag 1 og 2 gives 2 liter Fasthydral opløsning 2-3 gange dagligt.

Får dyret også mælk, kan man give fx 1-2 liter Fasthydral opløsning, efterfulgt af 1 liter mælk 1 time senere, 2-3 gange dagligt.

Dag 3 og 4 gives 1 liter fikseret hydralopløsning efterfulgt af 1 liter mælk.

Efter indtagelse af Fasthydral skal der gå mindst 1 time, før der gives mælk eller mælkeerstatning.

Smågrise: Giv hele kullet fri adgang til Fasthydral brugsopløsning.

Behandlingen bør gives i mindst 3-4 dage, eller indtil symptomerne er aftaget.

Et kuld smågrise omkring en uge gamle, kan drikke 2-3 liter elektrolytopløsning om dagen.

Fravænnede grise: En fravænnet gris kan drikke cirka 1-2 liter elektrolytopløsning om dagen afhængig af grisens alder.

Fordele ved Fasthydral

- Væskeerstatning med elektrolytter og gode tarmbakterier til hurtig genopretning.
- Nem at dosere præcis brugsopløsning.

Ingredienser pr. brusende tablet (33 g):

Laktose 16,43 g

Bicarbonat 6,27 g

Citronsyre 4,62 g

Natriumcarbonat 2,97 g

Kaliumchlorid 1,49 g

Opbevaring

Opbevares tørt og ved stuetemperatur (15-25°C).

Holdes utilgængeligt for børn.

Udløbsdato og batchnummer kan findes på yderkartonen.

Emballage:

Hver pakke indeholder 42 brusetabletter, pakket 2 og 2.